

"PLANTACION" - PRODUCTOS RECOMENDADOS PARA TABACO VIRGINIA VF - SALTA 2022



| DIAS TRANSPLANTE | PLAGAS / ENFERMEDADES | USOS | INGREDIENTE ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL | DOSIS RECOMENDADA | ACCION | FORMA DE APLICACIÓN | RECOMENDACIONES | PC (DIAS) | REI (HORAS) | CLASIFICACION |
|------------------|-------------------------------|-------------------|--|-----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--|-----------|-------------|-----------------------|
| 1° | HOJAS ANGOSTAS Y HOJAS ANCHAS | HERBICIDA | S - METOLACLOR 96% CLASE III | BAGUAL - DUAL GOLD - OTROS | 500 - 700 CC/ 200 LTS | SISTEMICA Y RESIDUAL | PULVERIZADO | Aplicar antes de emergencia de malezas. En el riego de asiento. Antes del trasplante | 7 | 24 | K3 (HRAC) o 15 (WSSA) |
| | | | CLOMAZONE 36% CLASE IV | COMMAND 36 CS | 500 - 700 CC/ 200 LTS | SISTEMICA Y RESIDUAL | PULVERIZADO | | 7 | 24 | F3 (HRAC) o 13 (WSSA) |
| 1° A 7° | MINADOR DEL TALLO | INSECTICIDA | THIAMETHOXAM 25% CLASE IV | ACTARA 25 SG | 600 - 800 GR/ 200 LTS | SISTEMICA | DRENCH | Volumen de 400 Lts/ha como mínimo. 15 cc por planta. | 14 | 12 | 4A (IRAC) |
| 1° A 7° | CORTADOR | INSECTICIDA | FLUBENDIAMIDE 48% CLASE III | BELT 48 SC | 50-75 CC/ 200 TLS | CONTACTO E INGESTION | DRENCH | Volumen de 400 Lts/ha como mínimo. 15 cc por planta. | 30 | 12 | 28 (IRAC) |
| | | | BACILLUS THURINGIENSIS 3,5% CLASE IV | DIPEL L PLUS | 500 CC/ 200 LTS | INGESTION | PULVERIZADO | Aplicar por la mañana temprano o la tarde noche. | 7 | 4 | 11 (IRAC) |
| 7° A 15° | RHIZOCTONIA | FUNGICIDA | AZOXYSTROBINA 25% CLASE IV | AMISTAR - SOXIS - QUADRIS - FUGAS | 800 - 1000 CC/ 200 LTS | SISTEMICA | DRENCH | Volumen de 400 Lts/ha como mínimo. 15 cc por planta. | 7 | 12 | C3 :11 (FRAC) |
| 7° A 15° | PHYTOPHTORA / PYTHIUM | FUNGICIDA | PROPAMOCARB 62,5% + FLUOPICOLIDE 6,25% CLASE III | INFINITO - PROPERO | 1.000 CC/ 200 LTS | SISTEMICA | DRENCH | Volumen de 400 Lts/ha. 15 cc por planta. | 7 | 12 | 43 + 28 (FRAC) |
| | | | FOSETIL ALUMINIO 80% CLASE III | ALLIETE - AZIMUT | 0,5 - 1 KG/ 200 LTS | SISTEMICA | DRENCH | | 15 | 24 | 33 (FRAC) |
| 30° A 45° | MOSCA BLANCA | INSECTICIDA | SPIROTETRAMAT 15% CLASE III | MOVENTO | 120 - 180 CC/ 200 LTS | INGESTION | PULVERIZADO | Volumen de 200 - 300 Lts/ha como mínimo. | 30 | 24 | 23 (IRAC) |
| 45° | HOJA ANCHA | HERBICIDA | SULFENTRAZONE 50% CLASE IV | CAPAZ 50 SC | 600 - 800 CC/ 200 LTS | CONTACTO | PULVERIZADO | Después del aporque. En banda con adherente y suelo humedo. | 30 | 24 | E (HRAC) o 14 (WSSA) |
| 45° | PULGONES | INSECTICIDA | THIAMETHOXAM 25% CLASE IV | ACTARA | 100 GR/ 200 LTS | SISTEMICA | PULVERIZADO | Utilizar coadyuvante y mojar bien la planta. | 14 | 12 | 4A (IRAC) |
| 45° | TRIPS | INSECTICIDA | (METOXIFENOCIDE 30% + SPINETORAM 6%) CLASE IV | QUINTAL XTRA | 150 CC / 200 LTS | CONTACTO E INGESTION | PULVERIZADO | Aplicar con la presencia de las primeras 5 Ninfas. | 21 | 24 | 18 - 5 (IRAC) |
| 45° | COGOLLERO | INSECTICIDA | (METOXIFENOCIDE 30% + SPINETORAM 6%) CLASE IV | QUINTAL XTRA | 150 CC/ 200 LTS | CONTACTO E INGESTION | PULVERIZADO | Aplicar con la presencia de las primeras larvas. | 21 | 24 | 18 - 5 (IRAC) |
| | | | BACILLUS THURINGIENSIS CLASE IV | DIPEL L PLUS | 500 CC/ 200 LTS | INGESTION | PULVERIZADO | Aplicar por la mañana temprano o tarde noche. | 7 | 4 | 11 (IRAC) |
| 45° | MARANDOVA | INSECTICIDA | BACILLUS THURINGIENSIS CLASE IV | DIPEL L PLUS | 500 CC/ 200 LTS | INGESTION | PULVERIZADO | Aplicar por la mañana temprano o tarde noche. | 7 | 4 | 11 (IRAC) |
| 45° | ACARO | INSECTICIDA | SPIRODICLOFEN 24% CLASE III | ENVIDOR | 100 CC/ 200 LTS | CONTACTO | PULVERIZADO | Utilizar humectante y mojar bien la planta. | 30 | 24 | 23 (IRAC) |
| 70° A 90° | FLORES Y BROTES | INHIBE LOS BROTES | ALCOHOLES GRASOS CLASE IV | FAIR 85% | 1 GAL/200 LTS | CONTACTO | LOCALIZADA | Aplicar antes de inicio de cosecha entre 15 - 20 cc/pl. | 7 | 24 | NA |
| | | | HIDRACIDA MALEICA 36% CLASE IV | VENDAVAL - MH 36 | 4 - 5 LTS/200 LTS | SISTEMICA | LOCALIZADA | | 7 | 24 | NA |
| | | | FLUMETRALIN 12,5% CLASE II | PRIME - BROTA - DREXALIN - DE ORO | 3 - 4 LTS/200 LTS | SISTEMICA | LOCALIZADA | | 7 | 24 | NA |
| 100° | SISTEMICO | | HIDRACIDA MALEICA 36% CLASE IV | VENDAVAL - MH 36 | CONSULTAR AL TECNICO | SISTEMICA | LOCALIZADA | La dosis es de acuerdo al potencial de producción de la planta. | 7 | 24 | NA |

| CLASIFICACION SEGÚN LOS RIESGOS | | | OBSERVACIONES | |
|--|----------|------------|--|--|
| CLASE I a | ROJO | MUY TOXICO | DRENCH = Aplicación de producto planta por planta.- | RESTRICCIÓN DE USO |
| CLASE I b | ROJO | TOXICO | PULVERIZADO = Aplicación con mochila o equipo de barras y picos. | PC = PERIODO DE CARENCIA (DIAS) |
| CLASE II | AMARILLO | PELIGROSO | LOCALIZADO = Aplicación de productor sobre el brote o cogollo. | REI = PERIODO DE REINGRESO (HORAS) |
| CLASE III | AZUL | CUIDADO | TRIPLE LAVADO = Luego de usar la totalidad del APC, lavar tres veces | NA = NO APLICA |
| CLASE IV | VERDE | CUIDADO | el envase, perforarlo y llevar a los centros de acopios (CAT) | CLASIFICACION: MODO O SITIO DE ACCION. |
| SEÑOR PRODUCTOR: | | | | |
| <p>> UTILICE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) EN CADA APLICACIÓN. PROHIBIDO EL USO DE APC POR MENORES DE 18 AÑOS Y PERSONAS DE RIESGO.-</p> <p>> LAS DOSIS RECOMENDADAS EN ESTA GUIA SON LAS SUGERIDAS POR EL FABRICANTE Y ORIENTATIVAS.-</p> <p>> LEA ATENTAMENTE LOS MARBETES DE CADA PRODUCTO, DOSIS, MOMENTO DE APLICACIÓN, TOXICIDAD, PERIODO DE CARENCIA Y REINGRESO.-</p> <p>> CONSULTE A SU TECNICO; LAS DOSIS PUEDEN VARIAR DE ACUERDO AL VIGOR DE LA PLANTA, HUMEDAD AMBIENTE Y TIPO DE SUELO.-</p> | | | | |